



NEORNIVET Programme de vaccination 2026

Pigeons

3-4 SEMAINES INTERVALLE

Jeunes

6 semaines d'âge	Rota-paramyxo
8 semaines d'âge	Salmonelle/paratyphoïde-herpès
10 semaines d'âge	Variole (injection/méth. folliculaire)
3-4 s avant 1ers vols d'entraînement	Rota-paramyxo RAPPEL
Mi-juin - début juillet*	Paramyxo-herpès RAPPEL (HERPÈS)

CONSEILS SUR MESURE

Contactez-nous via
info@neornivet.be

CALENDRIER La séquence et la fréquence des vaccins sont en partie déterminées par la pression d'infection dans le pigeonnier. Contactez Neornivet pour obtenir des conseils à ce sujet.

MALADIE DU JEUNE PIGEON Une **double vaccination** à 3-4 semaines d'intervalle contre le **rotavirus** offre la meilleure protection contre la maladie des jeunes pigeons (souvent appelée "adéno"). En cas de forte pression d'infection, un **3ème rappel** peut être administré 3 semaines avant la formation des pigeons. La vaccination contre l'adénovirus et le circovirus n'est pas recommandée en raison de leur efficacité non prouvée et de l'absence de souches pour les pigeons.

SOUTIEN Soutenez vos jeunes pigeons pendant la période de vaccination dans les 6 premières semaines après le sevrage avec **Immuno-Plus**, **Dysbac Liquid** et **Trichoryza Drops** de notre gamme de produits **NeorniPharma**.



Pigeons âgés et pigeons d'un an

Mi-février	Variole (injection/méth. folliculaire) PLUS-VALUE CLAIRE POUR LES PIGEONS D'UN AN
Fin février	Paramyxo-herpès
14 jours plus tard	Salmonelle/paratyphoïde**

SOUTIEN Guidez vos pigeons âgés et vos pigeons d'un an de façon optimale vers le début de la nouvelle saison avec **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** et **Ready** de notre gamme de produits **NeorniPharma**.



Pigeons reproducteurs

6-7 semaines avant la reproduction	Salmonelle/paratyphoïde**
Mi-octobre	Paramyxo-herpès

SALMONELLE/PARATYPHOÏDE Selon la pression de l'infection, il peut être nécessaire ou non de traiter les pigeons avant la vaccination et de les vacciner 1 à 2 fois.

HERPÈS En cas de problèmes d'herpès pendant la croissance des jeunes, il est recommandé de vacciner 2 fois les femelles reproductrices contre l'herpès.

PARAMYXO Une vaccination annuelle est obligatoire pour les pigeons reproducteurs.

SOUTIEN Stimulez les pigeons reproducteurs 2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1ère ponte avec **Vita-Min-DCP** et **Immuno-Plus** de notre gamme de produits **NeorniPharma**. Fertilisants pauvres/vieux mâles : complétez avec **Vit E+Se**.



* 3-4 s avant période critique - ** Év. après un traitement préventif en cas d'infection antérieure