



# NEORNIVET Programme de vaccination 2026

## Pigeons

3-4 SEMAINES INTERVALLE

### Jeunes

6 semaines d'âge	Rota-paramyxo
8 semaines d'âge	Salmonelle/paratyphoïde-herpès
10 semaines d'âge	<b>Variole</b> (injection/méth. folliculaire)
3-4 s avant 1ers vols d'entraînement	<b>Rota-paramyxo</b> RAPPEL
Mi-juin - début juillet*	Paramyxo-herpès RAPPEL (HERPÈS)

**CONSEILS SUR MESURE**  
Contactez-nous via [info@neornivet.be](mailto:info@neornivet.be)

**CALENDRIER** La séquence et la fréquence des vaccins sont en partie déterminées par la pression d'infection dans le pigeonnier. Contactez NeornivEt pour obtenir des conseils à ce sujet.

**MALADIE DU JEUNE PIGEON** Une **double vaccination** à 3-4 semaines d'intervalle contre **le rotavirus** offre la meilleure protection contre la maladie des jeunes pigeons (souvent appelée "adéno"). En cas de forte pression d'infection, un **3ème rappel** peut être administré 3 semaines avant la formation des pigeons. La vaccination contre l'adénovirus et le circovirus n'est pas recommandée en raison de leur efficacité non prouvée et de l'absence de souches pour les pigeons.

**SOUTIEN** Soutenez vos jeunes pigeons pendant la période de vaccination dans les 6 premières semaines après le sevrage avec **Immuno-Plus**, **Dysbac Liquid** et **Trichoryza Drops** de notre gamme de produits **NeorniPharma**.



### Pigeons âgés et pigeons d'un an

Mi-février	Variole (injection/méth. folliculaire) PLUS-VALUE CLAIRE POUR LES PIGEONS D'UN AN
Fin février	Paramyxo-herpès
14 jours plus tard	Salmonelle/paratyphoïde**

**SOUTIEN** Guidez vos pigeons âgés et vos pigeons d'un an de façon optimale vers le début de la nouvelle saison avec **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** et **Ready** de notre gamme de produits **NeorniPharma**.



### Pigeons reproducteurs

6-7 semaines avant la reproduction	Salmonelle/paratyphoïde**
Mi-octobre	Paramyxo-herpès

**SALMONELLE/PARATYPHOÏDE** Selon la pression de l'infection, il peut être nécessaire ou non de traiter les pigeons avant la vaccination et de les vacciner 1 à 2 fois.

**HERPÈS** En cas de problèmes d'herpès pendant la croissance des jeunes, il est recommandé de vacciner 2 fois les femelles reproductrices contre l'herpès.

**PARAMYXO** Une vaccination annuelle est obligatoire pour les pigeons reproducteurs.

**SOUTIEN** Stimulez les pigeons reproducteurs 2 semaines avant l'accouplement jusqu'à la 1ère ponte avec **Vita-Min-DCP** et **Immuno-Plus** de notre gamme de produits **NeorniPharma**. Fertilisants pauvres/vieux mâles : complétez avec **Vit E+Se**.



\* 3-4 s avant période critique - \*\* Év. après un traitement préventif en cas d'infection antérieure