

### Jongen

3-4W INTERVAL

6w leeftijd	<b>Rota-paramyxo</b>
8w leeftijd	Salmonella/paratyfus-herpes
10w leeftijd	<b>Pokken</b> (injectie/follikelmethode)
3-4w vóór opleren	<b>Rota-paramyxo</b> BOOSTER
Half juni - begin juli*	Paramyxo-herpes BOOSTER (HERPES)

**ADVIES OP MAAT**  
Neem contact met ons op via [info@neornivet.be](mailto:info@neornivet.be)

**TIMING** De volgorde en herhalingen van de vaccins wordt mede bepaald door de infectiedruk in uw hok. Neem contact op met NeorniVet om u hierin te laten begeleiden.

**JONGE DUIVENZIEKTE** Een **dubbele vaccinatie** met 3-4 weken tussentijd tegen het **rotavirus** geeft de beste bescherming voor de jonge duivenziekte ("adeno" in de volksmond). Bij zware infectiedruk kan er een **3e booster** gegeven worden, 3 weken voor het opleren. Vaccinatie tegen het adenovirus en het circovirus worden niet aangeraden, omwille van de niet-bewezen effectiviteit en het gebrek aan duivenstammen.

**ONDERSTEUNING** Ondersteun uw jonge duiven tijdens de vaccinatieperiode in de eerste 6 weken na het spenen met **Immuno-Plus, Dysbac Liquid** en **Trichoryza Drops** van onze productenlijn **NeorniPharma**.



### Oude duiven & jaarduiven

Midden februari	Pokken (injectie/follikelmethode) ENKEL INDIEN NIET GEVACCINEERD ALS JONG
Eind februari	<b>Paramyxo-herpes</b>
14d later	<b>Salmonella/paratyfus**</b>

**ONDERSTEUNING** Begeleid uw oude duiven en jaarduiven optimaal naar de start van het nieuwe seizoen met **Trichoryza Drops, Dysbac Liquid** en **Ready** van onze productenlijn **NeorniPharma**.



### Kweekduiven

6-7w vóór kweek	<b>Salmonella/paratyfus**</b> JAARLIJKSE BOOSTER
Midden oktober	<b>Paramyxo-herpes</b>

**SALMONELLA/PARATYFUS** Afhankelijk van de infectiedruk en de immuniteit is het al dan niet nodig om de duiven voor de vaccinatie te behandelen en 1 à 2 keer te vaccineren.

**HERPES** Bij herpes-problematiek tijdens de opgroei van de jonge duiven is het aangeraden om de kweekduivinnen 2 keer te vaccineren tegen herpes.

**PARAMYXO** Een jaarlijkse paramyxo-vaccinatie is verplicht voor de kweekduiven.

**ONDERSTEUNING** Stimuleer de kweekduiven 2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel met **Vita-Min-DCP** en **Immuno-Plus** van onze productenlijn **NeorniPharma**. Slechte bevruchtters/oude doffers: vul aan met **Vit E+Se**.



\* 3-4w vóór kritieke periode - \*\* Eventueel na preventieve behandeling bij eerdere besmetting