

Jongen

3-4w INTERVAL

6w leeftijd	Rota-paramyxo
8w leeftijd	Salmonella/paratyfus-herpes
10w leeftijd	Pokken (injectie/follikelmethode)
3-4w vóór opleten	Rota-paramyxo BOOSTER
Half juni - begin juli*	Paramyxo-herpes BOOSTER (HERPES)

ADVIES OP MAAT

Neem contact met ons op via info@neornivet.be

TIMING De volgorde en herhalingen van de vaccins wordt mede bepaald door de infectiedruk in uw hok. Neem contact op met NeorniVet om u hierin te laten begeleiden.

JONGE DUIVENZIEKTE Een **dubbele vaccinatie** met 3-4 weken tussentijd tegen het **rotavirus** geeft de beste bescherming voor de jonge duivenziekte ("adeno" in de volksmond). Bij zware infectiedruk kan er een **3e booster** gegeven worden, 3 weken voor het opleten. Vaccinatie tegen het adenovirus en het circovirus worden niet aangeraden, omwille van de niet-bewezen effectiviteit en het gebrek aan duivenstammen.

ONDERSTEUNING Ondersteun uw jonge duiven tijdens de vaccinatieperiode in de eerste 6 weken na het spenen met **Immuno-Plus**, **Dysbac Liquid** en **Trichoryza Drops** van onze productenlijn **NeorniPharma**.



Oude duiven & jaarduiven

Midden februari	Pokken (injectie/follikelmethode) ZEKER MEERWAARDE BIJ JAARDUIVEN
Eind februari	Paramyxo-herpes
14d later	Salmonella/paratyfus**

ONDERSTEUNING Begeleid uw oude duiven en jaarduiven optimaal naar de start van het nieuwe seizoen met **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** en **Ready** van onze productenlijn **NeorniPharma**.



Kweekduiven

6-7w vóór kweek	Salmonella/paratyfus**
Midden oktober	Paramyxo-herpes

SALMONELLA/PARATYFUS Afhankelijk van de infectiedruk en de immuniteit is het al dan niet nodig om de duiven voor de vaccinatie te behandelen en 1 à 2 keer te vaccineren.

HERPES Bij herpes-problematiek tijdens de opgroei van de jonge duiven is het aangeraden om de kweekduiven 2 keer te vaccineren tegen herpes.

PARAMYXO Een jaarlijkse paramyxo-vaccinatie is verplicht voor de kweekduiven.

ONDERSTEUNING Stimuleer de kweekduiven 2 weken voor het koppelen tot het 1e legsel met **Vita-Min-DCP** en **Immuno-Plus** van onze productenlijn **NeorniPharma**. Slechte bevruchters/oude doffers: vul aan met **Vit E+Se**.



* 3-4w vóór kritieke periode - ** Eventueel na preventieve behandeling bij eerdere besmetting